

Dióda lézeres szőrtelenítés alkalmassági teszt

Név:

Tegyen 'X'-et a karikába, amennyiben az utána következő állítás igaz Önre!

- ☐ Legalább 4 hete nem napozott, nem szoláriumozott és nem használt ön barnító krémet.
- ☐ Nem szed fényérzékenyítő gyógyszereket.
- ☐ Az elmúlt két hétben nem szedett antibiotikumot, vagy véralvadásgátló szereket.
- ☐ Az elmúlt két napban nem szedett fájdalomcsillapítót, vagy antidepresszánt.
- ☐ Nem terhes, vagy szoptat.
- ☐ Legalább 4 hete nem gyantázta, epilálta vagy csipeszezte a kezelendő területet.
- ☐ A kezelés előtti egy hétben nem szőkitett szőrt.
- ☐ Előző nap nem használt testápolót, izzadásgátlót vagy fényvédőt a kezelendő területen.
- ☐ Nincsen nem jellegzetes anyajegy, vagy rosszindulatú elváltozás a kezelendő területen.
- ☐ Nincs pacemaker, vagy szívritmus szabályozója.
- ☐ Nincs herpesz, sérülés, vagy nyílt seb a kezelendő területen.
- ☐ Nincs pörksenés a kezelendő területen.
- ☐ 18 év feletti.
- ☐ Nincs és nem is volt tetoválás a kezelendő területen.
- ☐ Nem volt a kezelendő területen korábban keloid képződés, vagy hipertrófiás forradás.
- ☐ Nem szedett Isotretinoin (Accutane) vagy bármilyen "A" vitamin származékot az utóbbi 12-18 hónapban.
- ☐ Nem rendelkezik a következő egészségügyi rendellenességekkel: erős cukorbetegség, nagyon magas vérnyomás, keringési zavarok, bőrbetegségek, rák, kemoterápia, epilepszia, szívelégtelenség.

Polgári jogi és büntető jogi felelősségem tudatában és cselekvőképességem teljes birtokában kijelentem, hogy az adott válaszok valósak és teljesek.

dátum

aláírás

Kezelés utáni tudnivalók

Enyhe leégés-szerű érzés normális. Ez általában 2-24 órán belül elmúlik, de akár 72 órán keresztül is fennállhat. A kezelés után óránként 15 percig tegyen jégakkut, hideg nedves kendőt vagy hűtött aloé vera zselét a kezelt területre, amíg a tünetek el nem múlnak. A hűtésen kívül 1%-os hydrocortisone krém használata ajánlott, 12 óránként a kezelés utáni első két napban. A 48 óra letelte után is tartsa hidratálva a területet, aloé vera krémmel vagy bármilyen illat-mentes hidratálóval. Smink viselhető a bőrpír eltűnése után.

Meleg vizes fürdő/zuhany a kezelés után 2 nappal használható. Ne használjon forró vizet és ne „áztassa” magát. Kerülje a szaunázást, jacuzzit vagy erős fizikai megerőltetést 48 órán át. A kezelt területek hőmérséklet-érzékenyek lehetnek.

Használjon lágy, nem karcoló, mesterséges illat- és színező- anyagoktól, olajtól mentes mosakodó szert. Kerülje arclemosók és tonikok használatát az első 48 órában. Ezt követően javasolt olyan tonik használata, amely tartalmazza az antioxidáns vitaminokat, A, C és E vitamint. Kerülje a bőrt irritáló készítményeket (benzil—peroxid, Retin-A, glikolsav, kémiai hámlasztók a kezelés után két héttel és két hétig a következő kezelés előtt). A bőrfiatalító, mikrodermabráziós vagy hámlasztó kezelések után 2 héttel gyógyultnak tekinthető a felület. Kerülje az erős dörzsölő felületeket és a kemény szivacsokat, a keféket és a bőrradírt, amíg a kezelt terület vissza nem kerül a kezelés előtti állapotba.

A fotokezelés utáni sebek a kezelés után besötétednek, körülöttük vörös keret jelenik meg. A következő 24-48 óra alatt egyre sötétebbé válnak. Egészen sötétbarnává vagy akár feketévé is válhatnak. A seb 2-3 napon belül elkezd hegesedni /váladékozni, majd lepatogni. A seb általában 7-10 nap alatt gyógyul meg. Folyamatosan halványodik a következő 2-4 hétben. Ne kapargassa vagy piszkálja a sebet, mert megmaradhat a heg.

A szőrtelenítő kezelés után 7-21 nappal borosta fog megjelenni, de ezek nem új szőrszálak, hanem a régiék, amik elhagyják a mirigyét. Ne rántsa, csipeszelje ki, gyantázza le a kezelt területet, mert csökkenti a kezelés sikerességét. A borotválás az egyetlen megengedett szőrtelenítő módszer. A szőrszálaknak, amelyek a kezelés idején nyugalmi fázisban vannak, az aktív szakaszba kell lépniük 1-6 hónapon belül, a test területétől függően.

Ha hólyagok vagy nyílt sebek keletkeznek, szabadon kell hagyni azokat, hogy hamarabb meggyógyuljanak. Ha a gyógyulás elhúzódik, krémmel meg lehet gyorsítani. Ne használjon petróleum tartalmú termékeket. A mellékhatások lehetnek helyi duzzanat, enyhe érzékenység. A tünetek rögtön a kezelés után vagy néhány napon belül jelenhetnek meg. A nem szteroid gyulladás gátlók segíthetnek, mint a paracetamol, segít csökkenteni a kellemetlenségeket.

Kerülje az Advil, Motrin vagy Ibuprofen használatát.

Kerülni kell a napozást, nap ellen is védő ruhát kell hordani és legalább 30 faktoros napvédőkrém használata kötelező a kezelés teljes időtartama alatt (5-8 hónap). Egy jó minőségű naptej cink –oxidot és titanium-dioxidot tartalmaz, melyek védenek az UVA és UVB sugárzás ellen is. A maximális védelemért 2 óránként kenje be magát újra.